

1. Το κρίσιμο σημείο αυτής της δευτερογενούς πρόληψης είναι η έγκαιρη ανίχνευση του προβλήματος ή αλλιώς η έγκαιρη – πρώιμη διάγνωση.

A) Σωστό

B) Λάθος

Σωστή απάντηση A

2. Το μεγαλύτερο ποσοστό της νοσηρότητας από καρκίνο στον τράχηλο της μήτρας βρίσκεται στις αναπτυσσόμενες και υπανάπτυκτες χώρες γιατί:

A) Σε αυτές τις χώρες δεν προβαίνουν σε τακτικούς προσυμπτωματικούς ελέγχους οι γυναίκες για πολιτισμικούς λόγους που σχετίζονται με τον γάμο και την απαγόρευση των προγαμιαίων σχέσεων.

B) Δεν υποστηρίζει το σύστημα υγείας τους επαρκώς προγράμματα εμβολιασμού και προσυμπτωματικού ελέγχου

Σωστή απάντηση B

3. Το τεστ Παπανικολάου για περίπου 60 χρόνια συγκράτησε την νοσηρότητα και τη θνητότητα από καρκίνο στον τράχηλο της μήτρας στις γυναίκες παγκόσμια.

A) Σωστό

B) Λάθος

Σωστή απάντηση A

4. Αν μια νέα γυναίκα αποφασίσει ότι θα κάνει συστηματικά προσυμπτωματικό έλεγχο, τότε δεν χρειάζεται να εμβολιαστεί έναντι του HPV.

A) Σωστό

B) Λάθος

Σωστή απάντηση B

5. Το HPV DNA test προσφέρει διπλάσια μακροχρόνια προστασία από την εμφάνιση καρκίνου στον τράχηλο, συγκριτικά με το τεστ Παπανικολάου.

A) Σωστό

B) Λάθος

Σωστή απάντηση A

6. Η μέθοδος της αυτοδειγματοληψίας του τεστ, φαίνεται να μην προσφέρει εξίσου αξιόπιστα αποτελέσματα με αυτή που διενεργεί ο επαγγελματίας υγείας.

A) Σωστό

B) Λάθος

Σωστή απάντηση B

7. Μόλις το 25% με 30% των Ελληνίδων κάνει συστηματικά τεστ Παπ με βάση ελληνικές μελέτες.

A) Σωστό

B) Λάθος

Σωστή απάντηση A

8. Προσωπικοί, γνωστικοί, κοινωνικοί, ψυχολογικοί, πολιτισμικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορεί να επηρεάζουν μια γυναίκα στην απόφαση να προβεί σε προσυμπτωματικό έλεγχο.

A) Σωστό

B) Λάθος

Σωστή απάντηση A